

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Амоксивет LA (Amoxivetum LA).

Препарат представляет собой стерильную жидкость с осадком, при встряхивании образующую стойкую суспензию от белого до светло-желтого цвета.

В 1 мл препарата содержится 0,15 г амоксициллина.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 50, 100 и 200 мл.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Срок годности препарата 2 года от даты изготовления.



- **амоксициллин относится к полусинтетическим антибиотикам пенициллинового ряда, обладает**
- **широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов**
- **за счет тщательно подобранных пролонгаторов, препарат после инъекции действует в организме животного в течение 48 часов**
- **эффективен при лечении животных с заболеваниями дыхательного тракта и при маститах**

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Амоксивет LA применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям при бактериальных инфекциях респираторной и мочеполовой системы, заболеваниях кожи и мягких тканей, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину. Препарат эффективен при лечении животных с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, септициемией, колибактериозом, сальмонеллезом, стрептококкозом, бактериальной и энзоотической пневмонией, атрофическим ринитом, синдромом ММА и другими болезнями.

Препарат применяют внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг массы животного один раз в двое суток с равными интервалами до выздоровления, но не более трех инъекций. Перед применением флакон с лекарственным препаратом необходимо тщательно встряхнуть до получения однородной суспензии.

Максимальный объем лекарственного препарата для введения в одно место не должен превышать для крупного рогатого скота 20 мл, свиней 10 мл, мелкого рогатого скота и телят 5 мл, поросят 2 мл.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных. Молоко разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем через 4 суток после последнего введения лекарственного препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть использовано для кормления животных после термической обработки.

**ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛВЕТФАРМА»**

247050, г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г

Тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09

belvetfarm@yandex.by <https://belvetfarma.com>