



БелВетФарма

Вместе за здоровье животных!

МАСТИЦЕФ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мастичеф представляет собой суспензию от белого до светло-желтого цвета.

В одном шприце (10 г) содержится:

- 350 мг цефалексина натриевой соли;

- 35 мг гентамицина сульфата.

Препарат выпускают в одноразовых полимерных шприцах для внутримышечного введения массой 10 г. Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до плюс 25 °С. Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления.

- **антимикробные компоненты препарата обладают синергетическим действием**
- **действует бактерицидно на стафилококки вырабатывающие пенициллиназу**
- **высокая эффективность при гнойных маститах**
- **препарат не оказывает раздражающего действия на ткани молочной железы**

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат предназначен для лечения коров, овец и коз при клинических и субклинических формах мастита бактериальной этиологии. Содержимое шприца вводят внутримышечно, после сдаивания, один раз в сутки в течение 3-5 дней.

Перед применением препарата животное необходимо выдоить. Молоко (секрет) из пораженных долей вымени утилизировать. Вымя вымыть теплой водой и насухо вытереть, верхушку соска обработать антисептиком.

С шприца снять защитный колпачек, поместить наконечник шприца в канал соска и осторожно ввести содержимое. После этого наконечник извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата. Последующие сдаивания молока (секрета) из молочной железы можно проводить не ранее, чем через шесть часов после введения препарата, в отдельную посуду с последующей утилизацией секрета путем кипячения или смешивания с дезинфицирующим препаратом (глютекс, хлорная известь и др.). Применение препарата не исключает использование средств патогенетической и симптоматической терапии.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через семь суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных. Молоко разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем через пять суток после последнего применения лекарственного препарата.

**ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛВЕТФАРМА»**

247050, г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г

Тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09

belvetfarm@yandex.by <https://belvetfarma.com>