



БелВетФарма

Вместе за здоровье животных!

МАСТИВЕТ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мастивет представляет собой суспензию от светло-желтого до желто-коричневого цвета.

В одном шприце (8 г) содержится:

- 250 мг неомицина сульфата;
- 200 мг окситетрациклина гидрохлорида;
- 10 мг преднизолона.

Препарат выпускают в одноразовых полимерных шприцах для внутривымянного введения массой 8 г. Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 °С до плюс 25 °С. Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления.

- **комбинированный высокоэффективный антибактериальный препарат**
- **преднизалон снижает воспалительную реакцию, уменьшает болезненность и отечность тканей вымени**
- **выраженный терапевтический эффект в течении 24 часов**
- **препарат не оказывает раздражающего действия на ткани молочной железы**

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют при клинических и субклинических маститах бактериальной этиологии, внутривымянно, после сдаивания, один раз в сутки в течении 3-5 дней:

- крупному рогатому скоту вводят содержимое одного шприца (8 г);
- козам, овцам – 1/2 шприца (4 г).

Перед применением препарата животное необходимо выдоить. Молоко (секрет) из пораженных долей вымени утилизировать. Вымя вымыть теплой водой и насухо вытереть, верхушку соска обработать антисептиком.

С шприца снять защитный колпачек, поместить наконечник шприца в канал соска и осторожно ввести содержимое. После этого наконечник извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения лекарственного препарата. Последующие сдаивания молока (секрета) из молочной железы можно проводить не ранее, чем через шесть часов после введения препарата, в отдельную посуду с последующей утилизацией секрета путем кипячения или смешивания с дезинфицирующим препаратом (глютекс, хлорная известь и др.). Применение препарата не исключает использование средств патогенетической и симптоматической терапии.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Мясо и молоко животных в пищевых целях разрешается использовать не ранее, чем через 21 сутки после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных.

**ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛВЕТФАРМА»**

247050, г. Добруш, ул. Фрунзе, 17Г

Тел./факс: +375 232 26-36-29, +375 44 532-32-09

belvetfarm@yandex.by <https://belvetfarma.com>