БелВетФарма

Вместе за здоровье животных!

ОКСИТОЦИН 10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Окситоцин 10 представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета без механических включений.

В 1 мл препарата содержится 10 ЕД окситоцина, спирт бензиловый, вода для инъекций.

Препарат выпускают в стеклянных флаконах номинальным объемом 50, 100 и 200 мл.

Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Срок годности два года от даты изготовления. Хранить в недоступном для детей месте. После вскрытия и изъятия первой дозы, содержимое флакона допускается хранить при температуре от плюс 3 °С до плюс 8 °С и использовать в течение 48 часов.

- **увеличивает частоту и амплитуду сокращений матки при родах**
- **способствует остановке маточного кровотечения после оперативных вмешательств**
- **стимулирует поступление молока в крупные протоки и синусы, способствуя усилению отделения молока и освобождению вымени от секрета при лечении маститов**

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Препарат применяют для лечения животных с патологией родов и послеродового периода (слабые схватки во время родов, задержание последа, воспалительные процессы матки, субинволюция); при проведении кесарева сечения для сокращения матки и уменьшения кровотечения; для лечения свиноматок с синдромом метрит-мастит-агалактия (ММА), а также при лечении животных с маститом, для более быстрого и полного освобождения пораженной четверти вымени от скопившегося секрета.

Препарат вводят коровам, козам и овцам подкожно и внутримышечно, свиноматкам внутримышечно в следующих дозах:

- коровам: 8-10 ЕД на 100 кг массы тела животного;
- свиноматкам: 25-30 ЕД;
- козам, овцам: 10-20 ЕД.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

После применения препарата мясо и молоко животных может использоваться в пищевых целях без ограничений.

Официальный представитель в РФ
ООО "ВетЕвроФарм"
214032, г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, 2
тел +375 29 233-73-33; + 375 29 196-96-07
veteuropharm@yandex.ru; vefmanager@yandex.ru