



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лекарственная форма: суспензия для интрацистернального введения.

По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую суспензию от белого до желтого цвета.

В одном шприце-дозаторе (9 г) содержится: - 535 мг цефтиофура гидрохлорида.

Препарат выпускают в шприцах-дозаторах из полимерного материала номинальной массой 9 г.

Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

Срок годности препарата – 2 года от даты производства.



- содержит цефалоспорины 3-го поколения
- после начала лактации молоко от коров обработанных препаратом можно использовать без ограничений

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Фуромаст ДС применяют для профилактики (одномоментный запуск) маститов и лечения коров, больных маститами, в сухостойный период, вызванных микроорганизмами, чувствительными к антибиотикам цефалоспоринового ряда.

Препарат вводят интрацистернально с профилактической целью в здоровые, а с лечебной целью в пораженные четверти вымени, однократно, после последней дойки перед переводом в сухостойный период, но не позднее, чем за 30 суток до предполагаемого отела, в дозе, содержащее одно шприца-дозатора (9 г) на одну четверть вымени. Перед использованием шприца-дозатора с препаратом рекомендуется тщательно встряхнуть, а при необходимости подогреть до температуры тела животного.

Перед введением препарата полностью освобождают четверти вымени от содержимого; обрабатывают кожу соска антисептиком (очищающей салфеткой); снимают колпачок с канюли шприца-дозатора, вводят канюлю в сосковый канал и полностью выдавливают содержимое шприца-дозатора в каждую четверть вымени. Затем извлекают канюлю шприца-дозатора из соскового канала и пальцами пережимают сосок на 1–2 минуты. Проводят легкий массаж соска снизу-вверх для лучшего распределения препарата.

Фуромаст ДС запрещается использовать в период лактации и менее чем за 30 суток до отела.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

После отела молоко в пищевых целях используют без ограничений. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 16 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо используют для кормления непродуктивных животных.

Официальный представитель в РФ
ООО "ВетЕвроФарм"

214032, г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, 2
тел +375 29 233-73-33; + 375 29 196-96-07

veteuropharm@yandex.ru; vefmanager@yandex.ru